

BISHERIGES PACKUNGSDESIGN

ReFacto® 250 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 250 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 250 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 250 IU - Pó a solvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de utilizarlo.
Ver folleto informativo con instrucciones para utilizarlo.

Eliminar cualquier solución reconstituida que quede sobrante. No utilizar después de terminado el plazo de validez. Medicamento sujeto a receta médica escrita. Mantener fuera del alcance e de vista dos crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.

NEUES FARBKODIERTES PACKUNGSDESIGN

ReFacto® 250 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 250 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 250 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 250 IU - Pó a solvente para solução injetável
Reconstituir o pó antes do utilizá-lo.
Ver folheto informativo com instruções para utilizá-lo.
Eliminar qualquer solução reconstituída que tenha sobrado. Não utilizar depois de terminado o prazo de validade. Medicamento sujeito a receita médica escrita. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.

ReFacto® 500 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 500 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 500 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 500 IU - Pó a solvente para solução injetável
Reconstituir o pó antes do utilizá-lo. Ver folheto informativo com instruções para utilizá-lo.

Eliminar qualquer solução reconstituída que tenha sobrado. Não utilizar depois de terminado o prazo de validade. Medicamento sujeito a receita médica escrita. Manter fora do alcance e da vista dos crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.

ReFacto® 500 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 500 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 500 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 500 IU - Pó a solvente para solução injetável
Reconstituir o pó antes do utilizá-lo. Ver folheto informativo com instruções para utilizá-lo.
Eliminar qualquer solução reconstituída que tenha sobrado. Não utilizar depois de terminado o prazo de validade. Medicamento sujeito a receita médica escrita. Manter fora do alcance e da vista dos crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.

ReFacto® 1000 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 1000 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 1000 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 1000 IU - Pó a solvente para solução injetável
Reconstituir o pó antes de utilizarlo.
Ver folheto informativo com instruções para utilizá-lo.

Eliminar qualquer solução reconstituída que tenha sobrado. Não utilizar depois de terminado o prazo de validade. Medicamento sujeito a receita médica escrita. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.

ReFacto® 1000 IU/UI

Morotocog alfa
(Recombinant coagulation factor VIII)
(Factor VIII de coagulación recombinante)

ReFacto 1000 IU powder and solvent for solution for injection

Reconstitute powder before use.
See Package Leaflet with instructions for use.
Discard any remaining reconstituted solution.
Do not use after expiry date.
Medicinal product subject to medical prescription.

Keep out of the reach and sight of children.
For intravenous single use administration only.

ReFacto 1000 IU, polvo y disolvente para solución inyectable
Reconstituir el polvo antes de su uso. Ver el prospecto con las instrucciones de uso.
Desheche cualquier solución reconstituida sobrante.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Con receta médica.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Sólo para administración intravenosa en dosis única.

ReFacto 1000 IU - Pó a solvente para solução injetável
Reconstituir o pó antes do utilizá-lo. Ver folheto informativo com instruções para utilizá-lo.
Eliminar qualquer solução reconstituída que tenha sobrado. Não utilizar depois de terminado o prazo de validade. Medicamento sujeito a receita médica escrita. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Apenas para administração intravenosa de dose única.